

## Actellic 50 EC



# Actellic 50 EC

Poslední aktualizace:  
26.03.2020

## Insekticidy

### Ochrana rostlin

**Velikost balení:**

S-pac 4 x 5 l

**Složení:**

500 g/l

pirimiphos-methyl

**Formulace:**

EC □ emulgovatelný koncentrát

**Hlídá váš zisk ve skladech**

- Výborné fumigační vlastnosti s hloubkovým účinkem
- Spolehlivě hubí i skryté škůdce
- Reziduální účinek až 6 měsíců u přímo ošetřeného zrna kukuřice

**Mechanismus působení**

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu je určen pro efektivní a dlouhodobou ochranu skladů, sil, mlýnů, pekáren a provozů, jakožto i uskladněných obilnin proti širokému spektru skladištních škůdců.

Pirimiphos-methyl patří do skupiny organických sloučenin fosforu. Působí hlavně dotykově, požerově a fumigačně s výrazným hloubkovým účinkem. Eliminace zasáhnutého hmyzu je rychlá. Actellic 50 EC působí reziduálně v uzavřených prostorách (sklady, budovy) a na inertním povrchu (juta, dřevo, omítky, cihlové zdi, beton, kovy, plasty) až po dobu 1–3 měsíců. Přípravek ničí všechna stadia škodlivého hmyzu s výjimkou vajíček. Tento insekticidní přípravek se používá k hubení škodlivého hmyzu a roztočů zejména ve skladech, silech, stájích a provozech a k ochraně uskladněného obilí. Použití přípravku je zakázáno v drůbežárnách.

- Působí na široké spektrum skladištních škůdců a roztočů

- Vynikající reziduální účinnost na inertním povrchu
- Nízká toxicita k teplokrevným organismům
- Hubí všechna vývojová stadia hmyzu kromě vajíček
- Zahraniční obchod s takto ošetřeným obilím je možný bez omezení
- Bezpečné použití také pro sladovnický ječmen
- Snadná aplikace běžnými technickými prostředky

Prázdné sklady, provozy a sila ošetřujeme proti škůdcům postřikem všech zdí, podlah, stropů a ostatních zařízení, které přicházejí do kontaktu s uskladněnými komoditami. Dávku vody volíme podle typu povrchu, jenž je ošetřován. Optimální dávka je přibližně 100 ml aplikační kapaliny s koncentrací 0,5–1,5 % na 1 m<sup>2</sup> plochy u porézních povrchů (beton, omítka, zdivo, cihly). U hladkých povrchů (kachlíky, hladké dřevo, apod.) používáme přibližně 50 ml aplikační kapaliny s koncentrací 1,5–2,0 % na 1 m<sup>2</sup> plochy.

### Zkušenosti a doporučení

V současné době se insekticid Actellic® 50 EC používá nejčastěji k asanaci skladových zásob v silech a skladech, kde se maximálně využívá fumigačních a dotykových účinků tohoto přípravku při ochraně vysokých násypných vrstev. Po dobu několika týdnů se tak udržuje dostatečná koncentrace i pro hubení škůdců líhnoucích se ze skrytých vývojových fází (vajíček). Ošetření vykonávejte při teplotě vyšší než 10 °C. První příznaky působení na škůdce se projeví v průběhu 2 až 24 hodin. K úplnému úhynu dochází asi po sedmi dnech. Dávka přípravku a postřikové kapaliny závisí na typu naskladňovacího zařízení. Při kapacitě dopravníků 22,5–45 tun obilí za hodinu je dávka 8 ml produktu v 0,75 litru vody na tunu obilí. Při dopravnících s kapacitou pod 22,5 tuny za hodinu je dávka 8 ml v 1,5 litru vody na tunu obilí.

**Návod na výpočet koncentrace přípravku Actellic® 50 EC pro dodržení registrované dávky 8 ml/t:**

do 1 litru vody přidáme  $\frac{8 \cdot x}{y}$  ml přípravku Actellic® 50 EC

x = množství obilí v kg, které projde dopravníkem za 1 minutu

y = množství kapaliny v ml, které proteče aplikační tryskou za 1 minutu

#### Příklad:

Dopravník přemístí za jednu hodinu 40 tun obilí, tj. 667 kg za minutu. Aplikační tryskou proteče za 1 minutu 250 ml kapaliny (vody). Výsledek: do 1 litru vody přidáme 21 ml přípravku Actellic® 50 EC.

[Stáhnout etкетu](#)

## Product CP: Tabs

- [Registrace](#)

## Registrace

### Actellic 50 EC Mlýny, pekárny, sila

Mlýny, pekárny, sila

#### **Skladištní škůdci**

##### **Doporučená dávka přípravku**

0,5-1% 1,5-2%

**Ochranná lhůta**            2  
**(dny):**

---

### Actellic 50 EC Prázdné sklady

Prázdné sklady

#### **Skladištní škůdci**

##### **Doporučená dávka přípravku**

0,5-1% 1,5-2%

**Ochranná lhůta**            2  
**(dny):**

---

### Actellic 50 EC Provozy

Provozy

#### **Skladištní škůdci**

##### **Doporučená dávka přípravku**

0,5-1% 1,5-2%

**Ochranná lhůta**            14  
**(dny):**

---

### Actellic 50 EC Uskladněné obilniny

Uskladněné obilniny

#### **Skladištní škůdci**

**Doporučená dávka přípravku**

8 ml/t

**Ochranná lhůta**            42  
**(dny):**

---

---