

Česká republika

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.cz>)

[Domů](#) > Kokoška pastuší tobolka





Kokoška pastuší tobolka
Capsella bursa-pastoris

Kokoška pastuší tobolka

Slovenský název: Kapsička pastierska

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevelle

Čeleď: brukvovité – Brassicaceae.

Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, **ozimé**.

Popis

Jednoletá až přezimující, tvarově variabilní bylina, málo náročná na půdní podmínky. Stonek má přímý, až 50 cm vysoký. Malé, bílé, koncové květy jsou uspořádány v okolíku.

Stoněk: lodyha přímá, jednoduchá nebo rozvětvená, jemně rýhovaná, dolů řídce chlupatá, 0,2–0,5 m vysoká.

Listy: střídavé, od 5–7 listu podlouhlé a postupně nepravidelně laločnaté, čepel dlouhá 20,0–30,0 mm, spodní listy v přízemní růžici, řapíkaté, horní listy objímavé, všechny listy chlupaté delšími rovnými nebo krátkými hvězdicovitými chloupky.

Květenství (květy): hrozen hustý, přímý, květní stopky odstávající, lupínky opakvejitě, bílé, kvete v březnu až září.

Rozlišovací znaky

Děložní listy jsou velmi malé, položené. Primární listy jsou celokrajné, pozdější listy jsou výběžkaté až laločnaté.

Plod: šešulka, v obrysu hranatě srdčitá, 4,0–7,0 x 3,0–5,0 mm, na vrcholu uťatá, semeno 0,7–1,0 x 0,5 x 0,2–0,3 mm, elipsovité, zploštělé, zřetelný kořínek, oddělený rýhou, středně lesklé, jemně síťovitě jamkovité, světle žluté, žlutohnědé až rezavé, na bázi světlejší, počet semen na rostlině do 5 tisíc, životnost v půdě 7–11 (někdy až 35) let.

Klíčící a vzešlá rostlina: klíčí celoročně z hloubky do 20–30 mm, $t_{\min.}$ 1–2 °C, $t_{\text{opt.}}$ 15–26 °C, $t_{\max.}$ 32–34 °C, hypokotyl špinavě zelený, děložní lístky, elipsovité, drobné, 2,0–4,0 x 1,5–2,0 mm, krátce řapíkaté, lysé, bez zřetelné žilnatiny, těsně nad zemí, epikotyl není, první dva listy vstřícné, okrouhlé až elipsovité, 6,0–14,0 x 4,0–7,0 mm, řapíkaté, bílé chloupky, celokrajné.

Období vzcházení: Téměř celoroční

Podzemní orgán: kořen křulovitý.

Hospodářský význam: méně nebezpečné (++)

Kdy druh úspěšně regulovat: do začátku prodlužování květního stonku.

Na první pohled se podobá druhům: huseníček rolní

Doporučené Syngenta přípravky

[Banvel 480 S](#)

[Callisto 480 SC](#)

[Elumis](#)

[Gardoprim Plus Gold 500 SC](#)

[Lumax](#)

[Milagro](#)

[Touchdown Quattro](#)

[Boxer](#)

[Camaro](#)

[Defi Evo](#)

[Brasan 540 EC](#)

[Teridox 500 EC](#)

[Arcade 880 EC](#)
