

Česká republika

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.cz>)

[Domů](#) > Oves hluchý







Oves hluchý
Avena fatua

Oves hluchý

Plodiny

- Ječmen jarní
- Cibule
- Cukrovka
- Řepa krmná
- Kapusta
- Mrkev krmná
- Okrasné dřeviny
- Ovocné školky
- Mák setý
- Pšenice

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevely

Popis

Jednoletá lipnicovitá tráva blízkce příbuzná ovsu setému. Vyskytuje se především v teplomilných plodinách, např. jarních obilninách, okopaninách, kukuřici; původně na vápenatých, vlhkých těžkých hlinitých a jílovitých půdách, dnes téměř na všech stanovištích. Životnost v půdě je 3-10 let. Průměrný počet výhonů/rostlinu bývá 1-3, v krajních případech až 16 lat/rostlinu. Rozmnožuje se semeny, 65-200 semen/rostlina (až 3 000 semen/m²). Škodlivost je kolem 0,5 t/ha při výskytu 100 lat/m², závisí na plodině a stavu porostu

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, stáčejší se doleva, okraje čepele listu na bázi listu jsou výrazně obrvené.

Pochva bývá otevřená, lysá; jazýček pak dlouhý 3–6 mm, bílo-žlutý, roztřepený.

Klíčivost je časně jaro, únor až polovina května. Minimální teplota klíčení bývá 3–5 °C, hloubka klíčení pak 2 až 20 cm.
