


Česká republika

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.cz>)

[Domů](#) > Rosička krvavá





Rosička krvavá
Digitaria sanguinalis

Rosička

Slovenský název: Prstovka krvavá

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Čeleď: lipnicovité – Poaceae.

Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, **jarní pozdní**.

Popis

Jednoletá, trsy tvořící tráva s prstovitě rozvětveným jemným květenstvím. Teplomilná. Květenství tvoří lichoklasy. Vyskytuje se v kukuřici a okopaninách, na písčítých suchých půdách, často s nedostatkem vápníku, ale dostatkem ostatních živin. Životaschopnost bývá cca 3 roky. Rozmnožuje se semeny, až 2 000 semen/rostlina. Co se týká škodlivosti, má vysokou konkurenční schopnost.

Stonek: Stéblo kolénkatě vystoupavé, 0,1-0,7 m vysoké, na bázi i kolénkách zakořeňuje, hladké, holé.

Listy: další listy ploché, pochvy ±nafouknuté, dlouze štětinaté, čepele 10,0-24,0 x 3,0-5,0 mm, na rubu leskle chlupaté, vyčnívající bíle žilkované.

Květenství (květy): lichoklasy (4-6), vzpřímené nebo přímo odstávající ve tvaru prstů, štíhlé, dlouhé až 60,0 mm, klásky kopinaté, špičaté, dlouhé 3,0-4,0 mm, kvete v červenci až říjnu.

Podzemní orgán: svazčitý kořen, s hustými silnějšími i tenčími kořeny.

Plod: plevová obilka 2,8 x 0,8 mm, v obrysu podlouhle kopinatá, na hřbetní straně vypouklá, na břišní plochá, na bázi zřetelný klíček, na rozdíl od jiných obilek opadává i s plevami, plevy blanité, s podélnou výraznou žilnatinou, hnědé až načervenalé, plucha a pluška pevně objímají obilku, šedohnědé, počet semen na rostlině až 5000.

Klíčící a vzešlá rostlina: klíčí a vzchází pozdě na jaře, když má půda teplotu 15-20 °C, při optimální teplotě 20-24 °C; z hloubky 50-60 mm, mezokotyl dobře vyvinutý, drobná vzcházející rostlina má asi 1 mm, dlouhý blanitý koleoptyl, první list je kopinatý, 6,0-8,0 x 2,0-2,5 mm, špičatý, s dlouhými chlupy, jazýček krátký, 1,0-2,0 mm vysoký, výborně snáší kyselou půdu.

Kdy druh úspěšně regulovat: do začátku odnožování.

Na první pohled se podobá druhům: rosička lysá.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, listová čepel zelená až červeno-fialová, po obou stranách jemně ochlupená, bílo-načervenalý střední nerv, bělejší okrajový nerv. Listová pochva bývá okrouhlá, dlouze řasnatá.

Doporučené řešení Syngenta

[Gardoprim Plus](#)

[Listego](#)

[Zetrola](#)
