



Listopad 2015

Vysoký výskyt přenašečů viróz v ozimých obilninách

Vážení pěstitelé ozimého ječmene,

 **Cruiser® 350 FS**

může se zdát, že je zima už za dveřmi, ale přesto zbývá udělat několik základních kroků pro zachování zdraví vašich porostů. Ačkoli bylo vaše osivo hybridního ječmene ošetřeno insekticidním mořidlem Cruiser 350, nemůžeme nechat porosty bez další pozornosti. Účinnost insekticidního moření bývá kolem 6 týdnů po vysetí a proto právě v těchto dnech přichází období, kdy je třeba přistoupit k další vlně insekticidní ochrany.

Na základě signalizace je v těchto dnech monitorován vysoký výskyt přenašečů viróz, především kříška polního. Zároveň předpověď počasí očekává nadprůměrné teploty minimálně do poloviny listopadu.

Z těchto důvodů velmi doporučujeme provést insekticidní ošetření!

Pro porosty, které jsou ve vývojové fázi do 4 listů, je toto období kritické pro napadení virózy. Naše doporučení platí jak pro ozimé ječmeny, tak i pšenice. Pokud vaše osivo nebylo insekticidně ošetřeno, je tento krok zcela zásadní.

Nálety mšic lze sledovat i na webových stránkách ÚKZUZ – Aphid Bulletin, kde jsou pravidelně monitorovány týdenní výskyty jednotlivých druhů mšic

 **Karate®**
se Zeon technologií

(<http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organisms/aphid-bulletin/aphid-bulletin/>)



Mšice střemchová



Křísek polní