



SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ HERBICIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA ZÁKLADĚ S-METOLACHLORU

syngenta®

Výzva

S-metolachlor je látka potřebná na efektivní odplevelení kukuřice a slunečnice.

Díky vysoké účinnosti a originálnímu způsobu působení je hlavním spojencem v boji se širokým spektrem plevelů při střídání plodin. Aby bylo v budoucnu možné přípravek používat, je nutné dodržovat doporučené dávky a podmínky použití pro jednotlivé plodiny a stanovení nárazníkových zón.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Následující doporučení společně se všeobecnými právními předpisy a doporučením v etiketě jsou základem správných zemědělských postupů.

- Mírné srážky a teplé počasí podporují účinek přípravků obsahujících S-metolachlor
- Použijte na vlhkou, dobře upravenou půdu bez hrud
- Použijte schválené střední trysky
- Nepoužívejte během deště nebo před očekávaným deštěm
- Nepoužívejte, pokud fouká vítr překračující 4 m/s

POUŽITÍ

- Během jednoho vegetačního období je možné jen jedno použití
- Nepřekračujte maximální jednorázovou dávku
- Použití vyšší aplikační dávky se doporučuje v případě pokročilejších vývojových fází plevelů nebo při jejich masivním výskytu
- Použijte po zasetí, před nebo bezprostředně po vyklíčení rostliny

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Zabraňte úletu postřiku na sousední rostliny (dle doporučení použijte střední intenzitu postřiku)
- Dávejte pozor, aby nedošlo k překrytí postřiku (například na souvratích).

OCHRANNÉ PÁSY

- Vodní nádrže a odtoky - je nutné zřídit ochranná pásma minimálně 10 m široká.
- Zemědělsky nevyužívaná půda - nutné zřídit ochranné pásmo o šířce od 1 do 10 m, v závislosti na produktu
- Odtokové příkopy ze zemědělských podniků a cest - zachovat vzdálenost min. 1 m.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ



NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY

- Ochrana vody
- Ochrana před erozí
- Podporuje biologickou různorodost

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI

- 20 m od pasek
- 10 m od vodních ploch
- 3 m od veřejných cest
- 1 - 10 m od zemědělsky nepoužívané půdy

PŘÍPRAVA POSTŘIKU A PLNĚNÍ POSTŘIKOVAČE

- Před použitím protřepte obsah balení.
- Prázdné obaly třikrát vypláchněte vodou a obsah vylejte do nádrže postřikovače.
- Postřikovač plňte min. 20 m od studní, vodních zdrojů nebo vodních nádrží a odtoků.

ZBYTKY POSTŘIKŮ A ČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVAČE

Zředte a použijte na místě, kde se prováděla aplikace.

nebo

Zneškodněte pomocí technických řešení typu biobed nebo RemDry.

Doporučujeme umývat postřikovač ve vzdálenosti alespoň 30 m od studní, vodních zdrojů, vodních nádrží a odtoků.

OCHRANA BĚHEM OŠETŘENÍ

Při přípravě nebo během aplikace produktu:



Noste dlouhé a těsné ochranné rukavice (např. nitrilové) nebo ochrannou kombinézu, pro ochranu před průnikem chemických látek, označených znakem CE



Noste ochranné brýle nebo jinou ochranu tváře



Noste vysokou obuv, přes kterou je možné natáhnout kombinézu



Během manipulace s přípravky na ochranu rostlin nejezte, nepijte a nekuřte



Nepoužívejte mobilní telefon



syngenta®

© Registrovaná ochranná známka společnosti ve skupině společností Syngenta.

Syngenta Czech s.r.o.
Coral Office Park Nové Butovice Budova D,
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

www.syngenta.cz